

Unitatea in care are loc consultul
.....

Medic.....

Data

FISA DE EXAMINARE A PACIENTULUI EDENTAT PARTIAL

Nume

Prenume

Data nasterii

Sex

Profesia/Ocupatia

Adresa

Telefon

Motivele prezentarii

Antecedente personale patologice generale

Afectiuni generale

Interventii chirurgicale efectuate

Medicatie

Alergii

Tratamente actuale

Antecedente personale patologice stomatologice

Suferă de una din următoarele afecțiuni: odontale parodontale gingivo-mucozale

S-au efectuat următoarele tratamente: odontale parodontale chirurgical
 ortodontic protetic

Istoricul edentatiei partiale

Prima afecțiune dentară a debutat în data de

Ordinea și cronologia pierderii dinților

Cauza pierderii dinților boala carioasă și complicațiile ei
 parodontopatia
 asocierea bolii carioase cu cea parodontală
 alte cauze

Obiceiuri vicioase onicofagia poziții vicioase din unele profesii
 muscarea unor obiecte masticatie unilaterală
 suptul policelui masticatie frontală
 muscarea limbii
 muscarea obrazului

Parafunctii: bruxism diurn respiratie orala
 bruxism nocturn deglutitie infantila

Tic nervos la nivelul cavitatii orale

Aprecierea starii de igiena buco-dentara

Frecventa spalatului pe dinti pe zi

Tehnica periajului

Tipul comportamental receptiv cooperant ostil
 receptiv necooperant sceptic
 indiferent

Examenul exooral

Inspectia

Dezvoltarea constitutională: endomorf mezomorf ectomorf

Tipul constitutional al fetei: muscular respirator cerebral digestiv

Aspectul si culoarea tegumentelor

Simetria in plan frontal al fetei: pastrata alterata

Forma fetei: rotunda ovala triunghiulara patrata prelungita

Proportionalitatea etajelor fetei: pastrata etajul inf. marit etajul inf. micșorat

Aspectul buzelor: contur

volum

simetrie

mobilitate

expresivitate

Fanta labiala este: normala modificata anormal

Aspectul santurilor periorale: normal accentuat sters

Profilul: drept convex concav

Din profil, buza superioara: o depaseste pe cea inferioara cu 1-2 mm
 o depaseste pe cea inferioara cu mai mult de 2 mm
 este dapasita de cea inferioara cu peste 2mm

Amplitudinea deschiderii gurii este: normala (40-60mm)

peste 60mm

sub 40mm

Aprecierea traiectului de deschidere-inchidere a gurii

La deschidere: fara devieri
 deviat spre dreapta
 deviat spre stanga
 deviat in baioneta
 continuu
 discontinuu

La inchidere: fara devieri
 deviat spre dreapta
 deviat spre stanga
 deviat in baioneta
 continuu
 discontinuu

Aprecierea dinamicii mandibulare fara contacte dento-dentare

Mobilitatea in miscarile limita active este: normala exagerata micsorata asociata cu durere

Mobilitatea in miscarile limita pasive este: normala exagerata micsorata asociata cu durere

Palparea

Textura tegumentului fetei este: elastica flasca indurata

Contururile osoase sunt: continue discontinue dureroase nedureroase

Emergenta pachetelor nervoase este: dureroasa nedureroasa

Urmatoarele grupe ganglionare au fost palpate: occipitala submandibulara
 retroauriculara submentoniera
 preauriculara cervicala, anterior de SCM
 geniana cervicala, posterior de SCM

Ganglionii limfatici palpati prezentau urmatoarele caracteristici: marime;
consistenta; relatia cu planurile osoase;
durere la palpare

Descrierea altor formatiuni detectate prin palpare
.....
.....

Examinarea musculaturii sistemului stomatognat

Tonusul muscular este: normal crescut scazut

Urmatorii muschi sunt sensibili la palpare extraorala: m. paravertebrali cervicali m. digastrici
 m. pterigoidieni interni m. vertexului
 m. temporali m. maseteri
 m- sterno-cleido-mastoidieni

Urmatorii muschi sunt sensibili la palpare intraorala: m. pterigoidian extern m. limbii
 m. pterigoidian intern m. planseului
 m. temporal

Examinarea ATM

Excursia condililor in cavitatile glenoide: normala limitata blocata simetrica asimetrica

La ascultatie se observa: absenta oricaror zgomote prezenta cracmentelor prezenta crepitatiilor

Aparitia zgomotelor se face: la miscarea de deschidere la miscarea de inchidere

Momentul aparitiei zgomotelor este: incipient mediu trativ

Examenul endooral

Aspectul mucoasei orale: normala indurata atrofica uscata fisurata iritata cu stomatopatie

Aspectul parodontiului de invelis: normal (coaja de portocala) papile hipertrofiate si inflamate
 congestionat sau pigmentat punji gingivale
 retractii gingivale avidarea spatiului inter-radicular
 prezenta ghirlandelor McCall fren labial cu insertie aberanta
 existenta fisurilor Stillman

Aprecierea crestelor alveolare la maxilar

Forma arcadei dentare este: semicerc patrulater parabolica
 pentagon hiperbolica in M
 elipsa evazata in U
 ingusta in omega asimetrica
 in V

Profilul pe sectiune: triunghiular parabolic trapezoidal

Inaltimea: pronuntata medie mica

Latimea: pronuntata medie mica

Directia crestelor alveolare: orizontala oblica ascendenta oblica descendenta concava neregulata

Dimensiunea mezio-distala a spatiilor intercalate edentate: pastrata micsorata marita

Distanta dintre creasta alveolara si planul de ocluzie: normala micsorata marita

Aspectul suportului osos: normal cu denivelari

Creasta alveolara este de: clasa I clasa II clasa III clasa IV

Tuberozitatile maxilare sunt de: clasa I clasa II clasa III clasa IV

Bolta palatina este de: clasa I clasa II clasa III clasa IV

Versantii vestibular si oral ai crestei alveolare sunt: retentivi neretentivi neutri

Muchia crestei alveolare este: rotuniita ascutita

Insertia frenurilor si bridelor laterale este: departe de creasta alveolara
 aproape de creasta alveolara
 pe varful crestei alveolare

Aprecierea crestelor alveolare la mandibula

Forma arcadei dentare este: semicerc patrulater parabolica
 pentagon hiperbolica in M
 elipsa evazata in U
 ingusta in omega asimetrica
 in V

Profilul pe sectiune: triunghiular parabolic trapezoidal

Inaltimea: pronuntata medie mica

Latimea: pronuntata medie mica

Directia crestelor alveolare: orizontala oblica ascendenta oblica descendenta concava neregulata

Dimensiunea mezio-distala a spatiilor intercalate edentate: pastrata micsorata marita

Distanta dintre creasta alveolara si planul de ocluzie: normala micsorata marita

Aspectul suportului osos: normal cu denivelari

Creasta alveolara este de: clasa I clasa II clasa III clasa IV

Versantii vestibular si oral ai crestei alveolare sunt: retentivi neretentivi neutri

Muchia crestei alveolare este: rotunjita ascutita

Insertia frenurilor si bridelor laterale este: departe de creasta alveolara
 aproape de creasta alveolara
 pe varful crestei alveolare

Limba este: normal colorata inflamata macroglosica de volum corespunzator
 depapilata saburala lucioasa neagra
 geografica iritata marginal cu leucoplazie cu devieri de pozitie
 cu candidoza cu ulceratii cu mobilitate normala cu mobilitate redusa
 cu tremuraturi cu lichen plan cu tulburari de fonatie cu perturbari de deglutitie

Orificiile glandelor salivare sunt: normale proeminente edematoase congestive ulcerate

Cantitatea si calitatea salivei: abundenta cu mucina redusa absenta limpede
 abundenta, apoasa tulbure purulenta

Curba sagitala de ocluzie von Spee este: normala applatizata accentuata

Curba transversala de ocluzie Wilson este: normala applatizata accentuata

Curba incizala este: convexa in jos concava in jos applatizata

Apelul dintilor

Altele																
Mobilitate																
Uzura																
Pozitie																
Ex. odontal																
	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
				5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5			
				8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5			
	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
Ex. odontal																
Pozitie																
Uzura																
Mobilitate																
Altele																

Examenul protezelor fixe vechi

Materialul din care sunt confectionate:

.....

Dinti stalpi

Relief ocluzal: corespunzator necorespunzator

Suprafetele axiale: normal conturate supraconturate infraconturate

Relatia cu parodontiul de invelis: corecta incorecta

Tipul de contact cu creasta alveolara: sa semisa punctiform tangential linear suspendat

Alte observatii:

.....

Examenul protezelor mobilizabile vechi

Tipul de proteza

Material

Estetica este: buna satisfactoare nesatisfactoare

Fonatia este: buna satisfactoare nesatisfactoare

Retentia este: buna satisfactoare nesatisfactoare

Stabilitatea este: buna satisfactoare nesatisfactoare

Extensia marginilor este: buna satisfactoare nesatisfactoare

Dimensiunea verticala de ocluzie este: acceptabila diminuata excesiva

Uzura este: minima moderata severa

Igiena este: buna satisfactoare nesatisfactoare

Alte observatii

.....

Plan de tratament

.....

.....

.....

.....

.....

Simboluri utilizate in adnotarea dintilor:

1. Carie dentara – **C**, cu localizarea topografica **O, M-O, D-O, M-O-D, co** (colet)
2. Pulpita – **P**
3. Gangrana – **G**
4. Obturatie din material nefizionomic (amalgam) – (**+O, M-O, D-O, M-O-D, co**)
5. Obturatie din material fizionomic – **o**, fotopolimerizabil – **fo**, autopolimerizabil – **au** (**+O, M-O, D-O, M-O-D, co**)
6. Gradul de uzura – **A1, A2, A3, A4**
7. Gradul de mobilitate – **M1, M2, M3**
8. Fisura dentara – **f**, fractura dentara – **F**
9. Oropozitie – **O-Pz**, Vestibulopozitie – **V-Pz**, Mezioversiune **M-Ve**, Distoversiune – **D-Ve**
10. Dinte absent – **X**
11. Dinte inclus – **Xⁱ**
12. Dinte extruzat – **Ex**
13. Dinte egresat – **Eg**
14. Dinte basculat – **Ba**
15. Dinte translat – **Tr**
16. Rest radicular – **r**
17. Abces dentar – **Ab.d.**
18. Abces paradontal – **Ab.p.**

